

Hinweise Ihres Arztes/Ihrer Ärztin

Weitere hilfreiche Informationen
inklusive Video mit Einnahme-
instruktionen unter www.pleinvue.at



Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat Ihnen für die bevorstehende Untersuchung eine Darmreinigung mit PLEINVUE® verordnet. Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen und nehmen Sie es immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Weitere wichtige Informationen unter anderem zu besonderen Warnhinweisen, Nebenwirkungen und der Lagerung von Pleinvue® entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

Hinweise zur Einnahme von Mahlzeiten am Tag vor der Untersuchung:

- ein leichtes Frühstück
- ein leichtes Mittagessen (*muss mindestens 3 Stunden vor der Einnahme der ersten Dosis beendet sein*)

Ab Beginn der Anwendung von Pleinvue® bis nach der klinischen Maßnahme **keine feste Nahrung** zu sich nehmen!

Trinken Sie keinen Alkohol, keine Milch, keine rot oder violett gefärbten Getränke (z. B. schwarzer Johannisbeersaft) oder jegliche andere Getränke, die Fruchtfleisch enthalten.



Zubereitung

1 Packung Pleinvue® enthält insgesamt 3 Beutel. Dosis 1: 1 Beutel; Dosis 2: 2 Beutel (A+B)



DOSIS 1




Geben Sie den Inhalt von Dosis 1 in ein Gefäß, das mindestens 500 ml Flüssigkeit fassen kann.



Füllen Sie mit Wasser auf 500 ml auf. **Rühren Sie, bis sich das Pulver aufgelöst hat.** Dieser Vorgang kann **bis zu ca. 8 Minuten** dauern.

DOSIS 2



Bereiten Sie zum verordneten Zeitpunkt den Inhalt von Dosis 2 (Beutel A und B) auf die gleiche Weise zu.

Einmal zubereitet, kann Pleinvue® sofort getrunken oder unter 25°C bzw. im Kühlschrank abgedeckt bis zu 24 Stunden aufbewahrt werden.

Einnahme DOSIS 1

Vorabend des Untersuchungstags

Dosis 1
PLEINVUE®*



0,5 l

+

klare
Flüssigkeit**



mind. 0,5 l



Trinken Sie Pleinvue® sowie die zusätzliche klare Flüssigkeit aufgeteilt und **SCHLUCKWEISE** über einen Zeitraum von **mindestens 1 Stunde.***

ÄRZTLICHE ANGABE ERFORDERLICH

Datum/Uhrzeit

Halten Sie sich während der Einnahme in Reichweite einer freien Toilette auf.



*Sie können vor, während und nach der Einnahme von Pleinvue® klare Flüssigkeit trinken. Um einen Flüssigkeitsmangel (Dehydration) zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Sie die zusätzlich verordneten Mengen an klarer Flüssigkeit trinken.

**Wasser, klare Suppe, Fruchtsäfte ohne Fruchtfleisch, Softdrinks, Tee und/oder Kaffee ohne Milch.

Einnahme DOSIS 2

Vorabend des Untersuchungstags (≥ 2 Stunden später)

Dosis 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0,5 l

+

klare
Flüssigkeit**



mind. 0,5 l



Trinken Sie Pleinvue® sowie die zusätzliche klare Flüssigkeit aufgeteilt und **SCHLUCKWEISE** über einen Zeitraum von **mindestens 1 Stunde.***

ÄRZTLICHE ANGABE ERFORDERLICH


Datum/Uhrzeit

Halten Sie sich während der Einnahme in Reichweite einer freien Toilette auf.



TIPPS: Pleinvue® gekühlt und/oder mit Strohhalm trinken. Vor Pleinvue® warmen Tee trinken, um den Magen „vorzuwärmen“; bzw. schluckweise warmen Tee zwischen den Pleinvue®-Schlucken. (herbe Teesorten wie z. B. Grünen Tee, Melissen-, Ingwer oder Zitronentee) In den „Trinkpausen“: Kaugummi kauen, Menthol-Zuckerln oder Zitronen- bzw. Orangenscheiben lutschen.

Untersuchung



ÄRZTLICHE ANGABE ERFORDERLICH

Datum/Uhrzeit



Beenden Sie die Einnahme jeglicher Flüssigkeiten spätestens:

- **zwei Stunden vor** der klinischen Maßnahme **unter Vollnarkose**, oder
- **eine Stunde vor** der klinischen Maßnahme **ohne Vollnarkose**

Planen Sie nach der letzten Einnahme ausreichend Zeit für die Anreise zu Ihrer Darmspiegelung ein.

WICHTIG: Bei Untersuchung unter Vollnarkose, dürfen Sie danach kein Fahrzeug lenken. (Versicherungsschutz entfällt)