

Dalja uputstva vašeg lekara/vaše lekarku

Vaš lekar/vaša lekarka vam je za predstojeći pregled prepisao/la čišćenje creva pomoću preparata PLEINVUE®. Pročitajte pažljivo celo priloženo uputstvo pre nego što počnete sa primenom ovog leka, i uzimajte ga uvek tačno kako je opisano u priloženom uputstvu, odn. tačno prema uputstvu svog lekara ili apotekara. Za dodatne informacije se obratite svom lekaru ili apotekaru. Dodatne važne informacije, između ostalog o važnim upozorenjima, neželjenim reakcijama i skladištenju Pleinvue®, pogledajte u uputstvu za upotrebu.

Uputstva za uzimanje obroka na dan ispitivanja:

- lagani doručak
- lagani ručak
- Prilikom uzimanja preparata Pleinvue® ujutru na dan pregleda, prethodno večer možete pojesti bistru supu, odnosno običan jogurt.
- U tom slučaju, večer treba da završite oko 20.00 h.

Od početka primene preparata Pleinvue® do završetka kliničkog zahvata ne uzimajte nikakvu čvrstu hranu!

Nemojte piti alkohol, mleko, ni pića crvene ili ljubičaste boje (npr. sok od crne ribizle), niti bilo koja druga pića koja sadrže voćnu pulpu.

DORUČAK

oko 6.00–10.00 h



RUČAK

oko 12.00–14.00 h



Prethodno večer

od oko 20.00 h



Priprema

1 pakovanje preparata Pleinvue® sadrži ukupno 3 kese. Za 1. dozu: 1 kesu; Za 2. dozu: 2 kese (A+B)

1. DOZA



Sipajte sadržaj 1. doze u posudu koja može da primi najmanje 500 ml tečnosti.



Dopunite vodom do 500 ml. **Mešajte dok se prah ne rastvori. Ovaj postupak može da traje do oko 8 minuta.**

2. DOZA



Na isti način u propisano vreme pripremite sadržaj doze 2 (kesice A i B).

Kada se pripremi, preparat Pleinvue® može odmah da se popije, ili da se čuva poklopljen na temperaturi do 25°C u frižideru do 24 sati.



Primena

1. doza ujutro pre pregleda

1. doza
PLEINVUE®*



0,5 l

+

bistra
tečnost**



najm. 0,5 l



Raspodelite Pleinvue® i dodatnu bistru tečnost u posude i **POPIJTE** ih u periodu od najmanje sat vremena.*

Tokom uzimanja budite u blizini slobodnog toaleta.



POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

*Pre, tokom i nakon uzimanja Pleinvue® možete da pijete bistru tečnost, kako biste izbegli gubitak tečnosti (dehidracija).

Važno je da pored toga pijete propisane količine bistrte tečnosti.

**Vode, bistrte supe, voćnih sokova bez pulpe, bezalkoholnih pića, čaja, i/ili kafe bez mleka

Primena

2. doza ujutro pre pregleda (≥ 2 sata kasnije)

2. doza (A+B)
PLEINVUE®*



0,5 l

+

bistra
tečnost**



najm. 0,5 l



Raspodelite Pleinvue® i dodatnu bistru tečnost u posude i **POPIJTE** ih u periodu od najmanje sat vremena.*

Tokom uzimanja budite u blizini slobodnog toaleta.




POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

SAVET: Pijte Pleinvue® ohlađen i/ili na slamčicu. Popijte topao čaj pre Pleinvue®, da biste „zagrejali“ stomak; ili uzimajte po gutljaj toplog čaja između gutljaja Pleinvue®. (Biljni čajevi poput zelenog čaja, čaja od matičnjaka, đumbira ili limuna.) Između ovih perioda žvačite žvaku, sisajte mentol bombonu ili kriške limuna ili pomorandže.

Pregled



Prekinite unos svih tečnosti:

- dva sata pre kliničkog zahvata pod totalnom anestezijom, ili
- jedan sat pre kliničkog zahvata bez totalne anestezije

POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

Nakon poslednjeg uzimanja planirajte dovoljno vremena za dolazak na kolonoskopiju.

VAŽNO: Nakon pregleda pod totalnom anestezijom ne smete da upravljate vozilom. (ne važi osiguranje)