

Dalja uputstva vašeg lekara/vaše lekark

Vaš lekar/vaša lekarka vam je za predstojeći pregled prepisao/la čišćenje creva pomoću preparata PLEINVUE®. Pročitajte pažljivo celo priloženo uputstvo pre nego što počnete sa primenom ovog leka, i uzimajte ga uvek tačno kako je opisano u priloženom uputstvu, odn. tačno prema uputstvu svog lekara ili apotekara. Za dodatne informacije se obratite svom lekaru ili apotekaru. Dodatne važne informacije, između ostalog o važnim upozorenjima, neželjenim reakcijama i skladištenju Pleinvue®, pogledajte u uputstvu za upotrebu.

## Uputstva za uzimanje obroka na dan ispitivanja:

- lagani doručak
- lagani ručak  
(mora da se završi najmanje 3 sata pre uzimanja prve doze)


**Od početka primene preparata Pleinvue® do završetka kliničkog zahvata ne uzimajte nikakvu čvrstu hranu!**

*Nemojte piti alkohol, mleko, ni pića crvene ili ljubičaste boje (npr. sok od crne ribizle), niti bilo koja druga pića koja sadrže voćnu pulpu.*

**DORUČAK** oko 6.00–10.00 h      **RUČAK** oko 12.00–14.00 h



**UVEČE**



## Priprema

1 pakovanje preparata Pleinvue® sadrži ukupno 3 kese. Za 1. dozu: 1 kesu; Za 2. dozu: 2 kese (A+B)



### 1. DOZA



Sipajte sadržaj 1. doze u posudu koja može da primi najmanje 500 ml tečnosti.



Dopunite vodom do 500 ml. **Mešajte dok se prah ne rastvori. Ovaj postupak može da traje do oko 8 minuta.**

### 2. DOZA



Na isti način u propisano vreme pripremite sadržaj doze 2 (kesice A i B).

*Kada se pripremi, preparat Pleinvue® može odmah da se popije, ili da se čuva poklopljen na temperaturi do 25°C u frižideru do 24 sati.*

## Primena

### 1. doza veće pre pregleda

1. doza  
PLEINVUE®\*



0,5 l

+

bistra  
tečnost\*\*



najm. 0,5 l



Raspodelite Pleinvue® i dodatnu bistru tečnost u posude i **POPIJTE** ih u periodu od najmanje sat vremena.\*

Tokom uzimanja budite u blizini slobodnog toaleta.



## POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

\*Pre, tokom i nakon uzimanja Pleinvue® možete da pijete bistru tečnost, kako biste izbegli gubitak tečnosti (dehidracija).

Važno je da pored toga pijete propisane količine bistrte tečnosti.

\*\*Vode, bistrte supe, voćnih sokova bez pulpe, bezalkoholnih pića, čaja, i/ili kafe bez mleka

## Primena

### 2. doza ujutro pre pregleda (≥ 2 sata kasnije)

2. doza (A+B)  
PLEINVUE®\*



0,5 l

+

bistra  
tečnost\*\*



najm. 0,5 l



Raspodelite Pleinvue® i dodatnu bistru tečnost u posude i **POPIJTE** ih u periodu od najmanje sat vremena.\*

Tokom uzimanja budite u blizini slobodnog toaleta.




## POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

**SAVET:** Pijte Pleinvue® ohlađen i/ili na slamčicu. Popijte topao čaj pre Pleinvue®, da biste „zagrejali“ stomak; ili uzimajte po gutljaj toplog čaja između gutljaja Pleinvue®. (Biljni čajevi poput zelenog čaja, čaja od matičnjaka, đumbira ili limuna.) Između ovih perioda žvačite žvaku, sisajte mentol bombonu ili kriške limuna ili pomorandže.

## Pregled



**Prekinite unos svih tečnosti:**

- dva sata pre kliničkog zahvata pod totalnom anestezijom, ili
- jedan sat pre kliničkog zahvata bez totalne anestezije

## POTREBNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Datum/vreme

Nakon poslednjeg uzimanja planirajte dovoljno vremena za dolazak na kolonoskopiju.

**VAŽNO:** Nakon pregleda pod totalnom anestezijom ne smete da upravljate vozilom. (ne važi osiguranje)