

كاتب بيط / كاتب بيط نم تاداشر!

لقد أوصاك طبيبك/طبيبك بإجراء تطهير للأمعاء باستخدام PLEINVUE® استعدادًا للفحص القادم. اقرأ نشرة العبوة الكاملة بعناية، قبل بدء استخدام هذا الدواء، والتزم دائمًا بتناول الدواء بالشكل الموصوف في النشرة أو حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه. لمزيد من المعلومات يُرجى. لمزيد من المعلومات المهمة، بما في ذلك التحذيرات الخاصة، والآثار الجانبية، وتخزين PLEINVUE®، يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام.

### إرشادات بخصوص تناول وجبات الطعام في اليوم السابق للفحص:

• إفطار خفيف

• غداء خفيف

• عند تناول PLEINVUE® في صباح يوم الفحص يمكنك في الليلة السابقة تناول حساء رائق و/أو زبادي طبيعي

• ينبغي في هذه الحالة إنهاء وجبة العشاء في حوالي الساعة 20.00.

غير مسموح بتناول أي طعام صلب من بداية استخدام PLEINVUE® وحتى بعد الإجراء السريري!

لا تتناول الكحوليات، أو الحليب، أو المشروبات ذات اللون الأحمر أو الأرجواني (مثل عصير الكشمش الأسود) أو أي مشروبات أخرى تحتوي على ألب الفواكه.

### صباحًا

حوالي الساعة 10.00-6.00

### ظهرًا

حوالي الساعة 14.00-12.00



بدءًا من حوالي الساعة 20.00

### الليلة السابقة



## التحضير

تحتوي العبوة الواحدة من PLEINVUE® على 3 أكياس; للجرعة 1: كيس واحد للجرعة 2: كيسان (A+B)

### الجرعة 1




ضع محتوى الجرعة 1 في إناء يتسع لمقدار 500 مل من السائل على الأقل.



املأ الإناء بمقدار 500 مل من الماء. قم بالتقليب حتى يذوب المسحوق. يمكن أن تستغرق هذه العملية حوالي 8 دقائق.

### الجرعة 2



٢. قم بتحضير محتوى الجرعة ٢ (الكيس A و B) في الوقت المحدد بنفس الطريقة.

بمجرد تحضيره، يمكن تناول PLEINVUE® على الفور أو الاحتفاظ به في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية أو تغطيته في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعات.

## تناول الدواء

الجرعة 1 في صباح يوم الفحص



الجرعة 1  
PLEINVUE®\*  
قئار لئاس\*\*  
على الأقل 0.5 لتر

قسم Pleinvue مع سائل صاف آخر إلى حصص واشربها على مدار ما لا يقل عن ساعة.

قبول طملا ةي بظلا تامول عملما

التاريخ/الوقت

أثناء تناول الجرعة احرص على التواجد بالقرب من تواليت غير مشغول.



\*يمكنك تناول سائل نقيه قبل وأثناء وبعد تناول Pleinvue®، لتجنب نقص السوائل (جفاف). من المهم أن تتناول بشكل إضافي الكميات الموصوفة من السوائل الصافية. \*\*الماء، الحساء الرائق، عصائر الفواكه دون لب الفواكه، المشروبات الغازية، الشاي، و/أو القهوة دون حليب

## تناول الدواء

الجرعة 2 في صباح يوم الفحص (بعد ساعتين)



الجرعة 2 (A+B)  
PLEINVUE®\*  
قئار لئاس\*\*  
على الأقل 0.5 لتر

قسم Pleinvue مع سائل صاف آخر إلى حصص واشربها على مدار ما لا يقل عن ساعة.

قبول طملا ةي بظلا تامول عملما

التاريخ/الوقت

أثناء تناول الجرعة احرص على التواجد بالقرب من تواليت غير مشغول.




نصيحة مفيدة: تناول Pleinvue باردًا و/أو باستخدام شفاطة. اشرب كوبًا من الشاي الدافئ قبل Pleinvue لتهيئة معدتك، أو خذ رشقات من الشاي الدافئ بين رشقات Pleinvue. (أنواع الشاي العشبي مثل الشاي الأخضر أو بلسم الليمون أو الزنجبيل أو شاي الليمون). بين هذه الأوقات، امضغ بعض اللبان أو قم بمص حلوى المنثول أو شرائح الليمون أو البرتقال.

## الفحص

توقف عن تناول أي سوائل:

قبل ساعتين من الإجراء السريري تحت التخدير الكامل، أو

قبل ساعة من الإجراء السريري دون التخدير الكامل



قبول طملا ةي بظلا تامول عملما

التاريخ/الوقت

يرجى التخطيط لتوفير وقت كافٍ، بعد تناول الجرعة الأخيرة، للذهاب إلى موعد تنظيف الأمعاء الذي ستقوم به. هام: إذا كنت قد خضعت لتخدير عام، لا يجوز لك القيادة بعدها. (لا يشترط وجو غطاء تأميني)