

Indicazioni del medico

Il suo medico le ha prescritto la pulizia dell'intestino con PLEINVUE®. **Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di iniziare ad assumere questo medicamento e lo assuma sempre esattamente come descritto nel foglietto illustrativo o seguendo le indicazioni del medico o del farmacista.** Per ulteriori informazioni importanti, relative ad esempio alle avvertenze particolari, agli effetti collaterali e alla conservazione di Pleinvue®, consultare il foglietto illustrativo.

Indicazioni per i pasti il giorno prima dell'esame:

- consumare una colazione leggera
- consumare un pranzo leggero
- la sera precedente: consumare del brodo e/o mangiare uno yogurt.
- In questo caso, la cena deve terminare circa alle ore 20.00.

Non assumere cibi solidi a partire dall'assunzione di Pleinvue® fino a dopo la procedura clinica!

Non beva alcol, latte, bevande rosse o viola (ad es. succo di ribes) né qualsiasi altra bevanda contenente polpa di frutta.

MATTINA
dalle ore 6.00
alle 10.00 circa



MEZZOGIORNO
dalle ore 12.00
alle 14.00 circa



LA SERA PRECEDENTE a partire dalle
ore 20.00 circa



Preparazione

1 confezione di Plenvu® contiene in tutto 3 bustine. Dose 1: 1 bustina; Dose 2: 2 bustine (A+B)

DOSE 1



Versare il contenuto della dose 1 in un recipiente che possa contenere almeno 500 ml di liquidi.



Aggiungere 500 ml di acqua. **Miscelare finché la polvere si scioglie.** Questo processo può durare **fino a 8 minuti.**

DOSE 2



Al momento prescritto, preparare il contenuto della dose 2 (bustine A e B) nello stesso modo.

Una volta preparato, Plenvu® può essere bevuto subito oppure conservato coperto fino a 24 ore a una temperatura inferiore ai 25°C o in frigorifero.



Assunzione

DOSE 1 la mattina dell'esame

Dose 1
PLEINVUE®*



0,5 l

+

liquidi
limpidi**



min. 0,5 l



Assumere Pleinvue® e l'altro liquido chiaro
A SORSI suddividendolo nell'arco di almeno
un'ora.*

Durante l'assunzione rimanga nelle
vicinanze di una toilette libera.



NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

*Prima, durante e dopo l'assunzione di Pleinvue® può bere liquidi limpidi per evitare una carenza di liquidi (disidratazione).

È importante che beva il quantitativo aggiuntivo di liquidi limpidi che le è stato prescritto.

**Acqua, brodo, succhi di frutta senza polpa, bibite, tè e/o caffè senza latte

Assunzione

Dose 2 la mattina mattina dell'esame (≥ 2 ore dopo)

Dose 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0,5 l

+

liquidi
limpidi**



min. 0,5 l



Assumere Pleinvue® e l'altro liquido chiaro
A SORSI suddividendolo nell'arco di almeno
un'ora.*

Durante l'assunzione rimanga nelle
vicinanze di una toilette libera.




NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

CONSIGLIO: bere Pleinvue® refrigerato e/o con una cannuccia. Prima di Pleinvue® bere del tè caldo per 'riscaldare' lo stomaco; oppure bere a sorsi alternando Pleinvue® e una bevanda calda (es. tisana, tè verde, infuso alla melissa, allo zenzero o al limone). Nell'intervallo tra un sorso e l'altro: masticare chewing gum, caramelle al mentolo o fette di arancia o limone.

Esame



Sospenda l'assunzione
di qualsiasi liquido:

- due ore prima della procedura clinica **in anestesia totale**, oppure
- un'ora prima della procedura clinica **senza anestesia totale**

NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

Dopo l'ultima assunzione, preveda sufficiente tempo per raggiungere il luogo in cui si sottoporrà alla colonscopia. **IMPORTANTE: dopo un'indagine diagnostica in anestesia totale non dovrà mettersi al volante. (L'assicurazione non copre gli eventuali danni)**