

В связи с предстоящим обследованием Ваш врач прописал Вам чистку кишечника с помощью препарата PLEINVUE®. **Перед началом использования настоящего препарата внимательно прочитайте информационный листок-вкладыш и всегда принимайте препарат в точном соответствии с инструкцией по применению или указаниями Вашего врача или провизора.** За более подробной информацией просим Вас обращаться к врачу или провизору. Дополнительная важная информация, включающая особые указания, данные о нежелательных явлениях и условиях хранения препарата ПЛЕИНВУЕ (PLEINVUE®), приведена в листке-вкладыше.

### Указания по приему пищи в день перед исследованием:

- легкий завтрак
- легкий обед
- В случае приема Plevinve® утром в день исследования накануне Вы можете
  - есть прозрачный суп и/или натуральный йогурт.
  - Ужин в таком случае следует закончить примерно в 20.00.

С момента начала применения препарата Plevinve® и до завершения клинического мероприятия не принимать твердой пищи!

Не пейте алкоголя, молока, напитков красного или фиолетового цвета (напр., сок черной смородины) и любых других напитков, содержащих фруктовую мякоть.



## Приготовление

1 упаковка Plevinve® содержит 3 пакетика; с дозой 1: 1 пакетик; с дозой 2: 2 пакетика (А+В)

### ДОЗА 1



Высыпьте содержимое дозы 1 в емкость, вмещающую не менее 500 мл жидкости.



Добавьте 500 мл воды. **Перемешивайте жидкость до полного растворения в ней порошка. Этот процесс займет около 8 минут.**

### ДОЗА 2



В назначенное время приготовьте содержимое дозы 2 (саше А и В) таким же способом.

Приготовленный раствор Plevinve® можно выпить немедленно или же оставить при температуре 25°C или в холодильнике в закрытом виде не более чем на 24 часов.



## Способ применения

Доза 1 утром в день исследования

**ДОЗА 1**  
**PLEINVUE®\***



0,5 л

+

прозрачная  
жидкость\*\*



мин. 0,5 л



Принимайте Pleinvue® и отдельно дополнительную прозрачную жидкость **ГЛОТКАМИ** в течение как минимум 1 часа.

**НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА**

При приеме препарата следует находиться вблизи свободного туалета.



Дата/время

\*Во избежание обезвоживания прозрачную жидкость можно выпить до, во время и после приема препарата ПЛЕИНВУЕ. Важно, чтобы Вы выпивали предписанное дополнительное количество прозрачной жидкости.

\*\*Вода, прозрачный суп, фруктовые соки без мякоти, газированные напитки, чай и/или кофе без молока

## Способ применения

Доза 2 утром в день исследования (через ≥ 2 часа)

**ДОЗА 2 (А+В)**  
**PLEINVUE®\***



0,5 л

+

прозрачная  
жидкость\*\*



мин. 0,5 л



Принимайте Pleinvue® и отдельно дополнительную прозрачную жидкость **ГЛОТКАМИ** в течение как минимум 1 часа.

**НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА**


При приеме препарата следует находиться вблизи свободного туалета.



Дата/время

**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:** Принимать препарат Pleinvue® следует в охлажденном виде и (или) через соломку. Перед приемом препарата Pleinvue® выпейте теплый чай, чтобы «разогреть» желудок, или пейте небольшими глотками теплый чай между приемами препарата. (Травяные чаи, такие как зеленый чай, чай с мятой лимонной, имбирем или лимоном.) Между приемами жуйте жвачку, рассасывайте ментоловые леденцы либо дольки лимона или апельсина.

## исследование



**НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА**

Дата/время



**Прекратите прием любых жидкостей:**

- за два часа до клинического мероприятия, проводимого под общим наркозом, или
- за один час до клинического мероприятия без применения общего наркоза

После последнего приема препарата запланируйте себе достаточно времени для прибытия на место проведения исследования. **ВАЖНО!** После обследования под общим наркозом пациентам не разрешается управлять автомобилем. (Страховое покрытие не предусмотрено)