

Udhëzime nga mjeku juaj

Mjeku/ja juaj ju ka këshilluar përmarrjen e ardhshëm një pastrim të zorrës me PLEINVUE®. Lexoni me kujdes fletë-udhëzuesin brenda në kuti, përpëra se të filloni me përdorimin e këtij medikamenti dhe merreni gjithmonë me saktësi siç është përshtkuar në fletë-udhëzues ose sipas udhëzimeve të mjekut ose të farmacistes suaj. Për informacione të tjera ju lutemi t'i drejtoheni mjekut tuaj ose në farmaci. Për informacione të mëtejshme të rëndësishme, duke përfshirë paralajmërimet e veçanta, efektet anësore dhe informacionin përmarrjen e Pleinvue®, ju lutemi t'i drejtoheni fletushkës së paketimit.

Udhëzime përmarrjen e vakteve të ngrënies gjatë ditës përpëra kontrollit:

- një mëngjes i lehtë
- një drekë i lehtë ((duhet të jetë përfunduar të paktën 3 orë përpëra marrjes së dozës së parë)

Nga fillimi i përdorimit me Pleinvue® deri pas marrjes së masës klinike mos konsumoni ushqime të forta!

Mos pini alkool, mos pini qumësht, mos pini pije me ngjyrë të kuqe ose me ngjyrë vjollcë (p.sh. lëng të zi manafere) ose pije të tjera që përbajnjë tul fryti.

MËNGJESI
rreth orës
6:00–10:00



DREKA
rreth orës
12:00–14:00



DARKA



Përgatitja

1 kuti Pleinvue® përbanë në përgjithësi 3 queska; Për dozën 1: 1 quesë; Për dozën 2: 2 queska (A+B)



DOZA 1




Hidhni përbajtjen e dozës 1 në një enë që mund të mbajë të paktën 500 ml lëngje.



Mbusheni me 500 ml ujë. **Përzjeni derisa pluhuri të jetë tretur. Ky proces mund të zgjasë deri në 8 minuta.**

DOZA 2



Përgatitni përbajtjen e dozës 2 (qeset A dhe B) në të njëjtën mënyrë në kohën e rekomanduar.

Sapo të përgatitet, Pleinvue® mund të pihet menjëherë ose të ruhet në frigorifer deri në 24 orë në temperaturë nën 25°C, e mbuluar.

Marrja e barit

Doza 1 në mbrëmjen përparrë kontrollit

Doza 1
PLEINVUE®*



+

lëngje
pa ngjyrë**



Pini Pleinvue® dhe lëngje të tejdukshme shtesë
në GLLËNJKËA të ndara në një periudhë prej të
paktën 1 ore.*



KËRKOHET INFORMACIONI MJEKËSOR

Data/Ora

*Për të shhangur dehidratimin, mund të pini lëng transparent përparrë, gjatë dhe pas marrjes së Pleinvue®.

Është shumë e rëndësishme që të pini sasitë e caktuara shtesë të lëngjeve pa ngjyrë.

**Ujë, supë pa ngjyrë, lëngje frutash pa tulin e frutit, pije freskuese, çaj dhe/ose kafe pa qumësht

Marrja e barit

Doza 2 në mbrëmjen përparrë kontrollit (≥ 2 orë më vonë)

Doza 2 (A+B)
PLEINVUE®*



+

lëngje
pa ngjyrë**



Pini Pleinvue® dhe lëngje të tejdukshme shtesë
në GLLËNJKËA të ndara në një periudhë prej të
paktën 1 ore.*




KËRKOHET INFORMACIONI MJEKËSOR

Data/Ora

KËSHILLË PRAKTIKE: Pijeni "Pleinvue" të ftohtë dhe/ose me pipëz. Pini çaj të nxeh të përparrë "Pleinvue" që të "ngrohni" stomakun, në të kundërt mund të pini pak çaj të nxeh të midis intervaleve të pirjes së "Pleinvue". (Çajrat me bazë bimore, të tillë si çaj i jeshil, çaj i me barbile, xhenxhefil apo limon.) Gjatë intervaleve, përdorni çamçakëz, thithni karamele me mente ose feta limoni apo portokalli.

Kontrolli



Përfundoni marrjen e lëngjeve:

- **dy orë përparrë** masave klinike me narkozë të plotë, ose
- **një orë përparrë** masave klinike pa narkozë të plotë

KËRKOHET INFORMACIONI MJEKËSOR

Data/Ora

Ju lutemi të planifikoni kohë të mjaftueshme pas marrjes së fundit, për kohën e udhëtimit për në kontrollin e enteroskopisë.

E RËNDËSISHME: Nuk ju lejohet të drejtoni automjetin pas një ekzaminimi me anestezi të përgjithshme.
(Nuk ka mbulim nga sigurimi)