

Օգտագործման ցուցումներ

Դեղն ընդունելը նախորդող երեկոյան



Ցուցումներ Ձեր բժշկի կողմից

Ձեր բժիշկը ձեզ հաստ ադիքի մաքրման համար PLEINVUE® է նշանակել զայիք բուժգործողությունը նախապատրաստվելու համար: Ուշադիր կարդացեք այս տուփի ներդիրն ամբողջությամբ՝ նախքան այս դեղորայքն ընդունելը, և միշտ այն ընդունեք ճշգրտորեն՝ ինչպես նկարագրված է այս ներդիրում կամ ինչպես որ հրահանգել են ձեր բժիշկը կամ դեղագործը: Լրացուցիչ կարևոր տեղեկատվության համար՝ ներառյալ Pleinvue®-ի վերաբերյալ հատուկ նախազգուշացումները, կողմնակի ազդեցությունները և պահպանման պահանջները, տես փաթեթի տեղեկատվական թերթիկը:

Ցուցումներ, թե ինչ ուտել օրվա ընթացքում քննությունից առաջ.

- թեթև նախաճաշ
- թեթև լանջ (դա պետք է ավարտել առնվազն 3 ժամ առաջ՝ նախքան առաջին դեղաչափն ընդունելը)

Մի կերեք որևէ պինդ կերակուր Pleinvue®-ն ընդունելն սկսելուց հետո մինչև կլինիկական գործողության ավարտը:

Մի խմեք ալկոհոլ, կաթ, կարմիր կամ մանուշակագույն խմիչքներ (ինչպես, օրինակ՝ սև հաղարջի հյութը) կամ պտղամիս պարունակող որևէ այլ խմիչք:

ԱՌՄՎՈՏ

Մոտավորապես առավոտյան ժամը 6-ի և 10-ի միջև




ԼԱՆՉ

Մոտավորապես կեսօրից՝ ժամը 12-ի և կեսօրն անց ժամը 2-ի միջև



ԵՐԵՎՈ



Պատրաստումը

1 տուփ Pleinvue®-ն պարունակում է ընդհանուրը 3 սաշե: Դեղաչափի 1-ի համար՝ 1 սաշե Դեղաչափի 2-ի համար՝ 2 սաշե (A+B)



ԴԵՂԱՉԱՓ 1




Դատարկեք դեղաչափի 1-ի պարունակությունը այնպիսի տարայի մեջ, որը կարող է տեղավորել առնվազն 500 մլ հեղուկ:



Չուր ավելացրեք մինչև 500 մլ: Լավ խառնեք, մինչև փոշին լուծվի: Այս գործողությունը կարող է տևել մինչև 8 րոպե:

ԴԵՂԱՉԱՓ 2



Պատրաստել 2 դեղաչափի պարունակությունը (սաշե Ա և Բ) նույն ձևով, ինչպես և նշանակված ժամանակ:

Պատրաստելուց հետո Pleinvue® -ն կարելի է ամփոփապես խմել կամ ծածկած պահել 25°C ջերմաստիճանի ներքո կամ մինչև 24 ժամ՝ սառնարանում:

Դեղն ընդունելը

Դեղաչափի քննության օրվան նախորդող երեկոյան

Դեղաչափ 1
PLEINVUE®*



0.5 l

+

Թափանցիկ
հեղուկ**



ըսպե 0.5 l



Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կումերով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում:*

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել:



ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

* Դուք կարող եք թափանցիկ հեղուկ խմել նախքան Pleinvue® ընդունելը, այն ընդունելու ընթացքում կամ դրանից հետո՝ ջրազրկվելուց խուսափելու համար:

** ջուր, արգանակ, մրգահյութ առանց պտղամսի, զովացուցիչ խմիչքներ, թեյ և/կամ սուրճ առանց կաթի

Դեղն ընդունելը

Դեղաչափի 2 (≥2 ժամ հետո)

Դեղաչափ 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0.5 l

+

Թափանցիկ
հեղուկ**



ըսպե 0.5 l



Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կումերով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում:*

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել:



ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԿ. Pleinvue-ն խմեք ստուգված և/կամ ձողիկի միջոցով: Pleinvue-ից առաջ խմեք տաք թեյ՝ ստամոքսը «տաքացնելու» համար, կամ էլ ընդունեք խմեք մի քանի կում տաք թեյ՝ Pleinvue-ի կումերի միջև: (Բուսական թեյերը, ինչպիսիք են կանաչ թեյը, պատրիճը, կոճապղպեղը կամ կիտրոնի թեյը): Այս ժամանակահատվածներում մաստակ ծամեք, մենթոլի համով կոնֆետ կերեք կամ էլ կիտրոնի կամ նարնջի կտորներ:

Քննություն



Դադարեցրեք որևէ հեղուկ ընդունելը՝

- ընդհանուր անզգայացմամբ կլինիկական գործողությունից երկու ժամ առաջ, կամ
- առանց ընդհանուր անզգայացման կլինիկական գործողությունից մեկ ժամ առաջ

ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

Խնդրում ենք խմելը վերջացնելուց հետո բավարար ժամանակ հատկացնել կողմնակապիտայի գնալու համար: **ԱՄԵՎՈՐ Է՝ Ձեզ չի թույլատրվում մեքենա վարել ընդհանուր անզգայացման պայմաններում զննում անցնելուց հետո: (Ապահովագրության ծածկույթ չկա)**