

Indicaciones del médico

Su médico le ha indicado que debe hacerse una limpieza intestinal con PLEINVUE® para poder someterse a la próxima prueba. **Lea con atención todo el prospecto antes de utilizar este medicamento y tómese siempre tal y como se describe en el prospecto o como le haya recomendado el médico o farmacéutico.** Si desea más información, consulte a su médico o farmacéutico. En las instrucciones de uso encontrará datos de importancia, como las advertencias, los efectos secundarios y el almacenamiento de Pleinvue®.

Instrucciones sobre la dieta la víspera de la prueba:

- Desayuno ligero
- Comida ligera (*se debe **terminar de comer al menos 3 horas** antes de la toma de la primera dosis*)

No coma alimentos sólidos desde que comience con el tratamiento con Pleinvue® hasta que termine con el procedimiento clínico.

No beba alcohol, leche, bebidas de color rojo o morado (por ejemplo, zumo de grosella negra) ni ninguna otra bebida con pulpa de fruta.


DESAYUNO
De 6:00 a 10:00
aproximadamente



COMIDA
De 12:00 a 14:00
aproximadamente



CENA



Preparación

1 paquete de Pleinvue® contiene 3 bolsas en total. Dosis 1: 1 bolsa; Dosis 2: 2 bolsas (A+B)

DOSIS 1



Añada el contenido de la dosis 1 a un recipiente que pueda contener al menos 500 ml de líquido.



Añada 500 ml de agua. **Revuelva hasta que el polvo se haya disuelto.** Este proceso puede durar **aproximadamente 8 minutos.**

DOSIS 2



Prepare el contenido de la dosis 2 (sobres A y B) en el momento indicado y de la misma forma que se ha indicado.

Una vez preparado, puede beberse Pleinvue® en ese mismo instante, o bien conservarlo tapado en el frigorífico por debajo de 25 °C hasta 24 horas.



Tomas

La dosis 1 la víspera de la prueba

Dosis 1
PLEINVUE®*



0,5 l

+

Líquido
claro**



como mínimo 0,5 l



Beba Pleinvue® y el líquido claro adicional en pequeñas porciones y SORBO A SORBO durante un período de al menos 1 hora.*



SE REQUIERE ESPECIFICACIÓN MÉDICA

Se recomienda estar cerca del baño cuando esté tomando el medicamento.

Fecha/hora

*Para evitar la deshidratación, beba líquidos claros antes, durante y después de tomar Pleinvue®.

Es importante que beba las cantidades adicionales de líquido claro que le han indicado.

**Agua, sopa ligera, zumos de frutas sin pulpa, refrescos, té o café sin leche.

Tomas

La dosis 2 la víspera de la prueba (≥2 horas después)

Dosis 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0,5 l

+

Líquido
claro**



como mínimo 0,5 l



Beba Pleinvue® y el líquido claro adicional en pequeñas porciones y SORBO A SORBO durante un período de al menos 1 hora.*




SE REQUIERE ESPECIFICACIÓN MÉDICA

Se recomienda estar cerca del baño cuando esté tomando el medicamento.

Fecha/hora

SUGERENCIA: Ingiera el Pleinvue® frío y use una pajita. Tómese una infusión caliente antes del Pleinvue®, para “preparar” el estómago; también puede tomar pequeños sorbos de la infusión caliente y alternarlos con los sorbos de Pleinvue®. (infusiones de hierbas, como el té verde, la infusión de melisa, jengibre o limón). Entre sorbo y sorbo, puede mascar chicle, tomar un caramelo de menta o chupar rodajas de limón o naranja.

Prueba



Cuándo debe dejar de tomar líquidos:

- **dos horas antes** del procedimiento clínico **si se utiliza anestesia general**, o bien
- **una hora antes** del procedimiento clínico **si no se utiliza anestesia general**.

SE REQUIERE ESPECIFICACIÓN MÉDICA

Fecha/hora

Tómese la dosis con tiempo suficiente para poder someterse a la colonoscopia.

IMPORTANTE: No conduzca ningún vehículo después de la prueba si lleva a cabo con anestesia general. (anulación de la cobertura del seguro)