

Indicazioni del medico

Il suo medico le ha prescritto la pulizia dell'intestino con PLEINVUE®. **Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di iniziare ad assumere questo medicamento e lo assuma sempre esattamente come descritto nel foglietto illustrativo o seguendo le indicazioni del medico o del farmacista.** Per ulteriori informazioni importanti, relative ad esempio alle avvertenze particolari, agli effetti collaterali e alla conservazione di Pleinvue®, consultare il foglietto illustrativo.

Indicazioni per i pasti il giorno prima dell'esame:

- consumare una colazione leggera;
- consumare un pranzo leggero; *(deve essere terminato **minimo 3 ore** prima dell'assunzione **della prima dose**)*

Non assumere cibi solidi a partire dall'assunzione di Pleinvue® fino a dopo la procedura clinica!

Non beva alcol, latte, bevande rosse o viola (ad es. succo di ribes) né qualsiasi altra bevanda contenente polpa di frutta.

MATTINA
dalle ore 6.00
alle 10.00 circa



MEZZOGIORNO
dalle ore 12.00
alle 14.00 circa



SERA



Preparazione

1 confezione di Pleinvue® contiene in tutto 3 bustine. Dose 1: 1 bustina; Dose 2: 2 bustine (A+B)

DOSE 1




Versare il contenuto della dose 1 in un recipiente che possa contenere almeno 500 ml di liquidi.



Aggiungere 500 ml di acqua. **Miscelare finché la polvere si scioglie.** Questo processo può durare **fino a 8 minuti.**

DOSE 2



Al momento prescritto, preparare il contenuto della dose 2 (bustine A e B) nello stesso modo.

Una volta preparato, Pleinvue® può essere bevuto subito oppure conservato coperto fino a 24 ore a una temperatura inferiore ai 25°C o in frigorifero.



Assunzione

DOSE 1 la sera prima dell'esame

Dose 1
PLEINVUE®*



0,5 l

+

liquidi
limpidi**



min. 0,5 l



Assumere Pleinvue® e l'altro liquido chiaro
A SORSI suddividendolo nell'arco di almeno
un'ora.*

Durante l'assunzione rimanga nelle
vicinanze di una toilette libera.



NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

*Prima, durante e dopo l'assunzione di Pleinvue® può bere liquidi limpidi per evitare una carenza di liquidi (disidratazione).

È importante che beva il quantitativo aggiuntivo di liquidi limpidi che le è stato prescritto.

**Acqua, brodo, succhi di frutta senza polpa, bibite, tè e/o caffè senza latte

Assunzione

Dose 2 la sera prima dell'esame (≥ 2 ore dopo)

Dose 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0,5 l

+

liquidi
limpidi**



min. 0,5 l



Assumere Pleinvue® e l'altro liquido chiaro
A SORSI suddividendolo nell'arco di almeno
un'ora.*

Durante l'assunzione rimanga nelle
vicinanze di una toilette libera.




NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

CONSIGLIO: bere Pleinvue® refrigerato e/o con una cannuccia. Prima di Pleinvue® bere del tè caldo per 'riscaldare' lo stomaco; oppure bere a sorsi alternando Pleinvue® e una bevanda calda (es. tisana, tè verde, infuso alla melissa, allo zenzero o al limone). Nell'intervallo tra un sorso e l'altro: masticare chewing gum, caramelle al mentolo o fette di arancia o limone.

Esame



Sospenda l'assunzione
di qualsiasi liquido:

- **due ore prima** della procedura clinica **in anestesia totale**, oppure
- **un'ora prima** della procedura clinica **senza anestesia totale**

NECESSARIA LA PRESCRIZIONE MEDICA

data/ora

Dopo l'ultima assunzione, preveda sufficiente tempo per raggiungere il luogo in cui si sottoporrà alla colonscopia. **IMPORTANTE: dopo un'indagine diagnostica in anestesia totale non dovrà mettersi al volante. (L'assicurazione non copre gli eventuali danni)**