

Инструкция по применению

Прием в день накануне исследования



Инструкции врача

В связи с предстоящим обследованием Ваш врач прописал Вам чистку кишечника с помощью препарата PLEINVUE®. Перед началом использования настоящего препарата внимательно прочтайте информационный листок-вкладыш и всегда принимайте препарат в точном соответствии с инструкцией по применению или указаниями Вашего врача или провизора. За более подробной информацией просим Вас обращаться к врачу или провизору. Дополнительная важная информация, включающая особые указания, данные о нежелательных явлениях и условиях хранения препарата ПЛЕИНВУЕ (PLEINVUE®), приведена в листке-вкладыше.

Указания по приему пищи в день перед исследованием:

- легкий завтрак
- легкий обед
(должен быть закончен не позднее чем за 3 часа до приема первой дозы)

С момента начала применения препарата Pleinvue® и до завершения клинического мероприятия не принимать твердой пищи!

Не пейте алкоголя, молока, напитков красного или фиолетового цвета (напр., сок черной смородины) и любых других напитков, содержащих фруктовую мякоть.



Приготовление

1 упаковка Pleinvue® содержит 3 пакетика; с дозой 1: 1 пакетик; с дозой 2: 2 пакетика (A+B)



ДОЗА 1



Высыпьте содержимое дозы 1 в емкость, вмещающую не менее 500 мл жидкости.



Добавьте 500 мл воды. Перемешивайте жидкость до полного растворения в ней порошка. Этот процесс займет около 8 минут.

ДОЗА 2



В назначенное время приготовьте содержимое дозы 2 (саше А и В) таким же способом.

Приготовленный раствор Pleinvue® можно выпить немедленно или же оставить при температуре 25°C или в холодильнике в закрытом виде не более чем на 24 часов.

Способ применения


Доза 1 в день накануне исследования

ДОЗА 1
PLEINVUE®*

прозрачная
жидкость**



+



Принимайте Pleinvue® и отдельно
дополнительную прозрачную жидкость
ГЛОТКАМИ в течение как минимум 1 часа.

НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА

Дата/время



При приеме препарата следует
находиться вблизи свободного туалета.

*Во избежание обезвоживания прозрачную жидкость можно выпить до, во время и после приема препарата ПЛЕИНВУЕ.
Важно, чтобы Вы выпивали предписанное дополнительное количество прозрачной жидкости.

**Вода, прозрачный суп, фруктовые соки без мякоти, газированные напитки, чай и/или кофе без молока

Способ применения

Доза 2 в день накануне исследования (через ≥ 2 часа)

ДОЗА 2 (A+B)
PLEINVUE®*

прозрачная
жидкость**



+



Принимайте Pleinvue® и отдельно
дополнительную прозрачную жидкость
ГЛОТКАМИ в течение как минимум 1 часа.

НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА


Дата/время



При приеме препарата следует
находиться вблизи свободного туалета.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Принимать препарат Pleinvue® следует в охлажденном виде и (или) через соломку. Перед приемом препарата Pleinvue® выпейте теплый чай, чтобы «разогреть» желудок, или пейте небольшими глотками теплый чай между приемами препарата. (Травяные чаи, такие как зеленый чай, чай с мелисой лимонной, имбирем или лимоном.) Между приемами жуйте жвачку, рассасывайте ментоловые леденцы либо дольки лимона или апельсина.

исследование



Прекратите прием любых
жидкостей:

- за два часа до клинического мероприятия, проводимого под общим наркозом, или
- за один час до клинического мероприятия **без применения общего наркоза**

После последнего приема препарата запланируйте себе достаточно времени для прибытия на место проведения исследования. **ВАЖНО!** После обследования под общим наркозом пациентам не разрешается управлять автомобилем. (Страховое покрытие не предусмотрено)

Дата/время

НЕОБХОДИМЫ УКАЗАНИЯ ВРАЧА