

Օգտագործման ցուցումներ

Կես դեղաչափի սխեման



Ցուցումներ Ձեր բժշկի կողմից

Ձեր բժիշկը ձեզ հաստ աղիքի մաքրման համար PLEINVUE® է նշանակել զալիք բուժգործողությունը նախապատրաստվելու համար: Ուշադիր կարդացեք այս տուփի ներդիրն ամբողջությամբ՝ նախքան այս դեղորայքն ընդունելը, և միշտ այն ընդունեք ճշգրտորեն՝ ինչպես նկարագրված է այս ներդիրում կամ ինչպես որ հրահանգել են ձեր բժիշկը կամ դեղագործը: Լրացուցիչ կարևոր տեղեկատվության համար՝ ներառյալ Pleinvue®-ի վերաբերյալ հատուկ նախազգուշացումները, կողմնակի ազդեցությունները և պահպանման պահանջները, տես փաթեթի տեղեկատվական թերթիկը:

Ցուցումներ, թե ինչ ուտել օրվա ընթացքում քննությունից առաջ.

- թեթև նախաճաշ
- թեթև լանջ (դա պետք է ավարտել առնվազն 3 ժամ առաջ՝ նախքան առաջին դեղաչափն ընդունելը)

Մի կերեք որևէ պինդ կերակուր Pleinvue®-ն ընդունելն սկսելուց հետո մինչև կլինիկական գործողության ավարտը:

Մի խմեք ալկոհոլ, կաթ, կարմիր կամ մանուշակագույն խմիչքներ (ինչպես, օրինակ՝ սև հաղարջի հյութը) կամ պտղամիս պարունակող որևէ այլ խմիչք:

ԱՌՄՎՈՏ

Մոտավորապես առավոտյան ժամը 6-ի և 10-ի միջև

ԼԱՆՉ

Մոտավորապես կեսօրից՝ ժամը 12-ի և կեսօրն անց ժամը 2-ի միջև



ԵՐԵՎՈ



Պատրաստումը

1 տուփի Pleinvue®-ն պարունակում է ընդհանուրը 3 սաշե: Դեղաչափի 1-ի համար՝ 1 սաշե Դեղաչափի 2-ի համար՝ 2 սաշե (A+B)



ԴԵՂԱՉԱՓ 1




Դատարկեք դեղաչափի 1-ի պարունակությունը այնպիսի տարայի մեջ, որը կարող է տեղավորել առնվազն 500 մլ հեղուկ:



Չուր ավելացրեք մինչև 500 մլ: Լավ խառնեք, մինչև փոշին լուծվի: Այս գործողությունը կարող է տևել մինչև 8 րոպե:

ԴԵՂԱՉԱՓ 2



Պատրաստել 2 դեղաչափի պարունակությունը (սաշե Ա և Բ) նույն ձևով, ինչպես և նշանակված ժամանակ:

Պատրաստելուց հետո Pleinvue® -ն կարելի է ամփոփապես խմել կամ ծածկած պահել 25°C ջերմաստիճանի ներքո կամ մինչև 24 ժամ՝ սառնարանում:

Դեղն ընդունելը

Դեղաչափի քննության օրվան նախորդող երեկոյան

Դեղաչափ 1
PLEINVUE®*



0.5 լ

+

Թափանցիկ
հեղուկ**



ըսպե 0.5 լ



Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կուներով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում։*

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել։



ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

* Դուք կարող եք թափանցիկ հեղուկ խմել նախքան Pleinvue® ընդունելը, այն ընդունելու ընթացքում կամ դրանից հետո՝ ջրազրկվելուց խուսափելու համար։

** ջուր, արգանակ, մրգահյութ առանց պտղամսի, զովացուցիչ խմիչքներ, թեյ և/կամ սուրճ առանց կաթի

Դեղն ընդունելը

Դեղաչափի 2 քննության օրվա առավոտը (մոտ 12 ժամ 1-ին դեղաչափից հետո)

Դեղաչափ 2 (A+B)
PLEINVUE®*



0.5 լ

+

Թափանցիկ
հեղուկ**



ըսպե 0.5 լ



Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կուներով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում։*

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել։



ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԿ. Pleinvue-ն խմեք ստուգված և/կամ ձողիկի միջոցով։ Pleinvue-ից առաջ խմեք տաք թեյ՝ ստամոքսը «տաքացնելու» համար, կամ էլ ընդունեք խմեք մի քանի կուներով տաք թեյ՝ Pleinvue-ի կուների միջև։ (Բուսական թեյերը, ինչպիսիք են կանաչ թեյը, պատրիճը, կոճապղպեղը կամ կիտրոնի թեյը)։ Այս ժամանակահատվածներում մաստակ ծամեք, մենթոլի համով կոնֆետ կերեք կամ էլ կիտրոնի կամ նարնջի կտորներ։

Քննություն



Դադարեցրեք որևէ հեղուկ ընդունելը՝

- ընդհանուր անզգայացմամբ կլինիկական գործողությունից երկու ժամ առաջ, կամ
- առանց ընդհանուր անզգայացման կլինիկական գործողությունից մեկ ժամ առաջ

ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

Խնդրում ենք խմելը վերջացնելուց հետո բավարար ժամանակ հատկացնել կողմնակապիտայի գնալու համար։
ԱՄԵՎՈՐ Է՝ Ձեզ չի թույլատրվում մեքենա վարել ընդհանուր անզգայացման պայմաններում զննում անցնելուց հետո։ (Ապահովագրության ծածկույթ չկա)

